

**TUMOR PRIMARIO NO HALLADO DE CABEZA Y CUELLO (PNHCyC).
(Anexo tablas y figuras)**

Tabla 1. Criterios de estadificación clínica de la enfermedad nodal en el PNHCyC.

| CLINICO (c) | CRITERIOS DE ESTADIFICACIÓN |
|-------------|---|
| | GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N) |
| NX | Ganglios regionales no pueden evaluarse. |
| N0 | Sin metástasis ganglionares regionales. |
| N1 | Metástasis en un único ganglio ipsilateral, 3 cm. o menos en su mayor dimensión y EEN* (-). |
| N2 | Metástasis en un ganglio único ipsilateral, > a 3 cm. pero no > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); o metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); o metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-). |
| N2a | Metástasis en un ganglio único ipsilateral, > a 3 cm. pero no > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); |
| N2b | Metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); |
| N2c | Metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-). |
| N3 | Metástasis en un único ganglio, > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); o metástasis en algún ganglio que, clínicamente, denote EEN (+) ² |
| N3a | Metástasis en un único ganglio, > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-) |
| N3b | Metástasis en algún ganglio que, clínicamente, denote EEN (+) ² |

Nota:

*EEN: Extensión extranodal.

1. Los ganglios de la línea media serán considerados como ipsilaterales.

2. La EENc se define por: invasión de la piel, infiltración muscular, fijación a estructuras profundas, nervios craneales, plexo braquial, cadena simpática o invasión del nervio frénico con disfunción.

La designación con la letra "U" o "L" debe ser usado para cualquier categoría N para indicar metástasis: por arriba ("U") o por debajo ("L") del borde inferior del cricoides.

Indistintamente, la EEN -tanto clínica como patológica- debe ser consignada como EEN (+) o EEN (-).

Tabla 2. Criterios de estadificación patológica de la enfermedad nodal luego de una linfadenectomía cervical en el PNHCyC.

| PATOLÓGICO (p) | CRITERIOS DE ESTADIFICACIÓN |
|----------------|---|
| | GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N) |
| NX | Ganglios regionales no pueden evaluarse. |
| N0 | Sin metástasis ganglionares regionales. |
| N1 | Metástasis en un único ganglio ipsilateral, 3 cm. o menos en su mayor dimensión y EEN (-) |
| N2 | Metástasis en un ganglio único ipsilateral o contralateral, ≤ a 3 cm. en su mayor dimensión y EEN (+); o metástasis en un ganglio único ipsilateral, > a 3 cm. pero < de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-). |
| N2a | Metástasis en un ganglio único ipsilateral o contralateral, ≤ a 3 cm. en su mayor dimensión y EEN (+); Metástasis en un ganglio único ipsilateral, > a 3 cm. pero < de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); |
| N2b | Metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); |
| N2c | Metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-). |
| N3 | Metástasis en un único ganglio, > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); o metástasis en un único ganglio ipsilateral, > de 3 cm en su mayor dimensión y EEN (+); o metástasis en ganglios múltiples ipsilaterales, contralaterales o bilaterales, alguno de ellos con EEN (+). |
| N3a | Metástasis en un único ganglio, > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-) |
| N3b | Metástasis en un único ganglio ipsilateral, > de 3 cm en su mayor dimensión y EEN (+); o metástasis en ganglios múltiples ipsilaterales, contralaterales o bilaterales, alguno de ellos con EEN (+). |

Nota:

1. Los ganglios de la línea media serán considerados como ipsilaterales.

2. La EEN detectada por histopatología debe ser consignada como EENmi (EEN ≤ a 2 mm) o EENma (EEN > a 2 mm).

Tanto la EENmi como la EENma califican como EEN (+) para la definición del pN.

La designación con la letra "U" o "L" debe ser usado para cualquier categoría N para indicar metástasis: por arriba ("U") o por debajo ("L") del borde inferior del cricoides.

Indistintamente, la EEN -tanto clínica como patológica- debe ser consignada como EEN (+) o EEN (-).

Tabla 3. Estadios clínicos y patológicos en PNHCyC, de acuerdo a la combinación de los criterios de la enfermedad nodal y la presencia de metástasis a distancia.

| CLINICO (c) Extensión de la enfermedad previa al tratamiento. | ESTADIFICACIÓN | | | PATOLÓGICO (p) Extensión de la enfermedad luego de la cirugía definitiva. |
|---|----------------|-------------|----|---|
| III | T0 | N1 | M0 | III |
| IVA | T0 | N2 | M0 | IVA |
| IVB | T0 | N3 | M0 | IVB |
| IVC | T0 | Cualquier N | M1 | IVC |

