

TUMOR PRIMARIO NO HALLADO DE CABEZA Y CUELLO (PNHCyC).
(Anexo tablas y figuras)

Tabla 1. Criterios de estadificación clínica de la enfermedad nodal en el PNHCyC.

CLINICO (c)	CRITERIOS DE ESTADIFICACIÓN
GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N)	
NX	Ganglios regionales no pueden evaluarse.
N0	Sin metástasis ganglionares regionales.
N1	Metástasis en un único ganglio ipsilateral, 3 cm. o menos en su mayor dimensión y EEN* (-).
N2	Metástasis en un ganglio único ipsilateral, > a 3 cm. pero no > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); o metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); o metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-).
N2a	Metástasis en un ganglio único ipsilateral, > a 3 cm. pero no > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-);
N2b	Metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-);
N2c	Metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-).
N3	Metástasis en un único ganglio, > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); o metástasis en algún ganglio que, clínicamente, denote EEN (+) ²
N3a	Metástasis en un único ganglio, > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-)
N3b	Metástasis en algún ganglio que, clínicamente, denote EEN (+) ²

Nota:

*EEN: Extensión extranodal.

1. Los ganglios de la línea media serán considerados como ipsilaterales.

2. La EEN se define por: invasión de la piel, infiltración muscular, fijación a estructuras profundas, nervios craneales, plexo braquial, cadena simpática o invasión del nervio frénico con disfunción.

La designación con la letra "U" o "L" debe ser usado para cualquier categoría N para indicar metástasis: por arriba ("U") o por debajo ("L") del borde inferior del cricoides.

Indistintamente, la EEN -tanto clínica como patológica- debe ser consignada como EEN (+) o EEN (-).

Tabla 2. Criterios de estadificación patológica de la enfermedad nodal luego de una linfadenectomía cervical en el PNHCyC.

PATOLÓGICO (p)	CRITERIOS DE ESTADIFICACIÓN
	GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N)
NX	Ganglios regionales no pueden evaluarse.
N0	Sin metástasis ganglionares regionales.
N1	Metástasis en un único ganglio ipsilateral, 3 cm. o menos en su mayor dimensión y EEN (-)
N2	Metástasis en un ganglio único ipsilateral o contralateral, ≤ a 3 cm. en su mayor dimensión y EEN (+); o metástasis en un ganglio único ipsilateral, > a 3 cm. pero < de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-).
N2a	Metástasis en un ganglio único ipsilateral o contralateral, ≤ a 3 cm. en su mayor dimensión y EEN (+); Metástasis en un ganglio único ipsilateral, > a 3 cm. pero < de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-);
N2b	Metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-);
N2c	Metástasis en ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno de ellos > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-).
N3	Metástasis en un único ganglio, > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-); o metástasis en un único ganglio ipsilateral, > de 3 cm en su mayor dimensión y EEN (+); o metástasis en ganglios múltiples ipsilaterales, contralaterales o bilaterales, alguno de ellos con EEN (+).
N3a	Metástasis en un único ganglio, > de 6 cm. en su mayor dimensión y EEN (-)
N3b	Metástasis en un único ganglio ipsilateral, > de 3 cm en su mayor dimensión y EEN (+); o metástasis en ganglios múltiples ipsilaterales, contralaterales o bilaterales, alguno de ellos con EEN (+).

Nota:

1. Los ganglios de la línea media serán considerados como ipsilaterales.
2. La EEN detectada por histopatología debe ser consignada como EENmi (EEN ≤ a 2 mm) o EENma (EEN > a 2 mm). Tanto la EENmi como la EENma califican como EEN (+) para la definición del pN.
- La designación con la letra "U" o "L" debe ser usado para cualquier categoría N para indicar metástasis: por arriba ("U") o por debajo ("L") del borde inferior del cricoides.
- Indistintamente, la EEN -tanto clínica como patológica- debe ser consignada como EEN (+) o EEN (-).

Tabla 3. Estadios clínicos y patológicos en PNHCyC, de acuerdo a la combinación de los criterios de la enfermedad nodal y la presencia de metástasis a distancia.

CLINICO (c) Extensión de la enfermedad previa al tratamiento.	ESTADIFICACIÓN				PATOLÓGICO (p) Extensión de la enfermedad luego de la cirugía definitiva.
	T0	N1	M0	III	
III	T0	N1	M0	III	
IVA	T0	N2	M0	IVA	
IVB	T0	N3	M0	IVB	
IVC	T0	Cualquier N	M1	IVC	




Figura 1. Algoritmo diagnóstico (de exclusión) para el tumor primario no hallado de cabeza y Cuello




Figura 2. Algoritmo terapéutico del tumor primario (escamoso) no hallado de cabeza y Cuello