

TRASPLANTE DE CÉLULAS PRECURSORAS HEMATOPOYÉTICAS
--

Cuadro 1. INDICACIONES DE TRASPLANTE ALOGENICO DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS EN ONCOHEMATOLOGIA.

TRASPLANTE ALOGENICO	
Leucemia aguda linfoblástica	Riesgo alto (con EMR + post inducción) Riesgo muy alto. Recaída/Refractaria. Phi positivas.
Leucemia aguda mieloblástica	Riesgo int-2 y alto (en RC1). Riesgo int-1: faltan estudios.
Aplasia medular adquirida	De acuerdo a edad, PS y comorbilidades.
Síndromes mielodisplásicos	IPSS Int-2 y alto. IPSS bajo e Int-1 postergar hasta progresión Anormalidad del Cromosoma 7 y cariotipo complejo: al diagnóstico.
Leucemia linfática crónica	Ptes aptos con LLC de alto riesgo. Se deberá definir el lugar frente a las nuevas drogas
Leucemia mieloide crónica	Primera fase crónica progresada bajo tratamiento con ITK. Fase acelerada o Crisis blástica o más de primera fase crónica. Ptes con mutaciones complejas y resistentes a ITK de 2a generación, ej: T315I. Ptes con severa intolerancia a todos los ITK disponibles.
Mielofibrosis	Se recomienda ofrecer el trasplante a un paciente con sobrevida esperada menor a 5 años. <ul style="list-style-type: none"> • IPSS, DIPSS o DIPSS-plus: riesgo intermedio-2 o alto. • MIPSS: riesgo alto # • GPSS: riesgo alto # • DIPSS plus: intermedio-1 +
Linfomas no Hodgkin Linfomas Hodgkin Mieloma Múltiple	Considerar la posibilidad de trasplante alogénico en pacientes recaídas post autólogo, si son quimiosensibles.

Cuadro 2. INDICACIONES DE TRASPLANTE AUTOLOGO DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS EN ONCOHEMATOLOGIA.

TRASPLANTE AUTOLOGO	
LNH difuso de células grandes B	Recaído y/o refractario primario quimiosensible. No en primera remisión completa.

LNH folicular	Rol controversial. Primera recaída precoz o ulteriores quimiosensibles. No en primera remisión completa. LNH folicular transformado?
LNH del manto	Pacientes jóvenes en primera RC (post esquema que incluya Rituximab y Citarabina)
LNH T periférico	Considerar en primera RC excepto el Anaplásico ALK +
Linfoma Hodgkin	Recaídos y refractarios quimiosensibles.
Mieloma Múltiple	Post tratamiento de inducción (forma parte de la primera línea de tratamiento)